

Használati útmutató



1. Távolítsa el a színes műanyag kupakot!
2. Távolítsa el az alumínium tokot!
3. Távolítsa el a szürke gumidugót!
4. Vegye elő az adagoló pumpát a műanyag csomagolásból!
5. Tartsa erősen az üvegsét, majd egyenes nyomással helyezze be a pumpát!
6. Távolítsa el a narancssárga biztonsági gyűrűt az adagoló pumpáról!
7. Néhány előpumpálással töltsse fel a pumpát! Az ötödik pumpálás után a pumpa egy egész adagot tartalmaz.
8. Helyezze a pumpa végét a szájába, a nyelve alá! Nyomja meg a pumpát úgy, hogy az egész adag a szájba kerüljön! A nyomást annyiszor ismétlje meg, ahány adagra szüksége van! 2 percig hagyja a nyelve alatt, majd nyelje le!
9. Használat után a pumpa szájrészét törölje meg, majd helyezze vissza a narancssárga biztonsági gyűrűt!
10. A következő használatnál a biztonsági gyűrű eltávolítása után a 6. és a 7. pont szerint járjon el!

Néhány fontos tudnivaló!

Milyen betegségek esetén javasolt az Allergén Specifikus ImmunTerápia?

1. Középsúlyos vagy súlyos szénanáthában.
2. Enyhe és középsúlyos asztmában.

A betegség súlyosságát a tünetek alapján az orvos határozza meg. Fontos, hogy a beteg hosszútávon együttműködjön kezelőorvosával, és kövesse minden utasítását.

Terhesség és szoptatás ideje alatt az allergológus dönt a kezelésselről.

Milyen esetekben nem javasolt az Allergén Specifikus ImmunTerápia?

Immunológiai vagy immunhiányos betegségben szenvedőknek; Daganatos betegeknek; Súlyos pszichiátriai kórképekben; β -blokkolót szedőknek; Súlyos asztmás betegeknek, és azoknak akiknek a légzésfunkciós vizsgálati eredményük (FEV1) még gyógyszeres terápia mellett is 70% alatti; 5. éves kor alatt, kivéve, ha orvosilag indokolt; Krónikus szájüregi betegségben.

Lehetséges mellékhatások:

Mint minden gyógyszernek a cseppek kezelésnek is lehetnek mellékhatásai. Előidézhet szápadlás viszketést, ajakduzzanatot vagy gyomorpanaszokat. Ezek nem indokolják a gyógykezelés változtatását. Ritkán előfordulhatnak: csalánkiütés, nátha, asztma. Ebben az esetben értesítse kezelőorvosát, hogy a megfelelő terápiáról dönthessen.



A készítmény tárolása:

- Az eredeti csomagolásban, álló helyzetben a hűtőben tároljuk +2 és +8 Celsius fok között. Utazáskor rövid időre hűtőn kívül is tárolható, de ajánlatos minél hamarabb hideg helyre tenni.
- Repülőút esetén a készítményt az utastérben szállítjuk, hogy ezzel megakadályozzuk a folyadék szivárgását a nyomásváltozás miatt.
- Az a készítmény, amely valamilyen oknál fogva megfagyott, már nem használható fel!
- Gyermekektől elzárva tároljuk!

Ha elfelejtette bevenni az adagját:



1. Amennyiben reggel elfelejtette bevenni a cseppeket, akkor ezt minél hamarabb tegye meg a napfolyamán.
2. Ha a készítményt ismételtelen elfelejtette bevenni, forduljon allergológusához!
3. Soha ne adja össze a kihagyott adagokat!

Miért válasszuk az Allergén Specifikus ImmunTerápiát?



- **Mert megelőző:** megakadályozza a betegség súlyosbodását, az asztma kialakulását.
- **Mert kezel:** a tüneti gyógyszerekhez hasonlóan a terápia ideje alatt csökkenti/megszünteti az allergiás panaszokat.
- **Mert gyógyít:** a terápia befejezése után is tartós tünetmentességet biztosíthat - éveken át!



A betegájékoztatóban található információkat nagy, tudományos, klinikai vizsgálatok eredményei támasztják alá. Az adatok megtalálhatóak az interneten és a Stallergenes termékek magyarországi forgalmazójának irodájában.

A Stallergenes termékek magyarországi forgalmazója:

STALL2008/1

Ewopharma AG Magyarországi Képviselete
H-1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. Tel: +36-1-200-4650
Fax: +36-1-398-0316 Honlap: www.ewopharma.com E-mail: info@ewopharma.hu

Új gyógymód az allergia kezelésében

A S I T

allergén
specifikus
immun-
terápia



☞ **Megelőzés**

☞ **Kezelés**

☞ **Gyógyítás**

Mi az allergia?

Az allergia a szervezet immunrendszerének kóros válaszreakciója olyan anyagokra, melyek természetes módon megtalálhatóak a környezetünkben (pl.: háziporatkák, virágporok = pollenek, állati szőrzet).

Az allergiás embereknél ezekkel az anyagokkal való érintkezés allergiás tüneteket válthat ki, amely szem- és torokviszketést, orrfolyást (szénanátha), légzési nehézségeket (asztmát) vagy bőrproblémákat (ekcémát, csalánkiütést) okozhat.



Allergia-típusok

1. Szezonális allergiák:

Jellemzőik: Fűvek, fák, gyomok virágzása idején - szezonban - okoznak csak tüneteket.

Példák: nyírfa - április, fűfélék - május-július,

parlagfű - július-október, fekete üröm-július-október.

2. Egész éven át tartó - perenniális allergiák:

Jellemzőik: Az allergénnel való találkozaskor okoznak tüneteket, akár egész éven át.

Példák: háziporatká-allergia (lakásban), penészgombák (zárt helyiségekben, lakásban), állati szőrök (kutya, macska, ló).



Eddig hogyan harcoltunk az allergia ellen?

1. Az allergének elkerülése

Minden esetben ajánlatos a kiváltó tényezők lehető legteljesebb elkerülése, amely nem minden esetben lehetséges. A fűfélék, gyomok, fák pollenjeinek elkerülése nehezen megoldható. A háziporatkák elleni védekezésben továbbra is segíthet az antiallergiás ágyneműk és matracok használata.



2. A tünetek kezelése, gyógyszerek:

Tüneti gyógyszerek (antihisztaminok, kortikoszteroidok, stb.) enyhítik ugyan az allergiás tüneteket és a gyulladást, de sajnos a kezelés megszakításával a tünetek újból jelentkezhetnek.



Miért kell feltétlenül kezelni az allergiás betegségeket?

1. Mert a kezeletlen betegeknél új allergénekre is kialakulhatnak a tünetek. Ilyen esetekben nehezebb hatékony kezelési sémákat (gyógyszerelést) kialakítani.

2. A szénanáthás tünetek az évek múltával nagy százalékban asztmás rohamokkal társulhatnak. Az asztmássá vált betegek életvitelük megváltoztatására kényszerülnek, életminőségük romlik.



A JÖVŐ: ÚJ GYÓGYMÓD - ASIT

A KEZELÉS



Allergén Specifikus ImmunTerápia: Megelőzés - Kezelés - Gyógyítás

Az ASIT jelenleg az egyetlen gyógymód az allergiás megbetegedéseknél, amely **Megelőz**, magát a kiváltó okot **Kezeli** és hosszútávon **Gyógyít**. Megakadályozza a betegség súlyosbodását és új allergiafajták kialakulását. Az Allergén Specifikus ImmunTerápia ideje alatt az immunrendszernek a kiváltó okhoz (allergénhez) való fokozatos hozzászoktatását értjük - a megfelelő allergének fokozatosan növekvő koncentrációban történő adagolásával. Bizonyos idő után az allergia tünetei enyhülhetnek, el is múlhatnak, így a tüneti kezelésre használt gyógyszerek mennyisége csökkenthető, akár el is hagyható.



1. Szezonális allergia esetén, cseppekkel:

Az Allergén Specifikus ImmunTerápia az adott pollenszezon előtt a kezelő orvos döntése alapján 2-10 hónappal kezdődik. A bevezető kezelésnél a betegnek 11 napon keresztül, fokozatosan emelve adagoljuk a megfelelő allergiaktivitást, mindaddig, amíg el nem érjük a szervezet által tolerált legmagasabb mennyiséget. Ezzel a dózissal folytatódik a fenntartó kezelés, mely lehet naponta 4 csepp vagy két naponta 8 csepp, és a pollenszezon végéig tart. A következő évben a terápia a szezon előtt újra indul és hasonlóan folytatódik. A szedés módja: a megfelelő mennyiségű cseppeket a páciens éhgyomorra a nyelve alá csepegteti, körülbelül 2 percig a nyelve alatt tartja, majd lenyeli. A hatásos gyógykezelés érdekében nagyon fontos a rendszeresség és a folyamatosság.



2. Szezonális és az egész éven át tartó (perenniális) allergia esetén, injekciós kúrával:

A bevezető kezelés az allergénkivonat egyre nagyobb mennyiségű adagjának a felkar külső felületébe történő fájdalommentes injektálásával történik 13 héten keresztül, heti 1 alkalommal. A fenntartó terápia a szervezet által tolerált legmagasabb dózissal folytatódik 4-6 hetes időközönként, egész éven át. Ez a kezelés csak intenzív terápiás háttérrel rendelkező intézményben adható, ahol a beteg az injekció után 20-30 perces megfigyelés alá kerül.



Meddig tart a gyógykezelés?

A páciens állapotában már az első évben várható javulás. Az Allergén Specifikus ImmunTerápia azonban 3-5 éven át tartó kezelés esetén a leghatékonyabb.

A gyógykezelés eredményes, ha:

- a tünetek enyhülnek vagy elmúlnak
- a páciens csökkentheti/elhagyhatja a tüneti gyógyszerek használatát anélkül, hogy állapota rosszabbodna.